

МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
БРАКА И
СЕМЬИ



фиксации на основном заболевании и астенические соматогенные расстройства, определявшие снижение либидо, дизритмию половых отправления с последующим развитием детренированности и застойного простатовезикулизма. Обращение за сексологической помощью чаще обуславливалось требованиями партнерши. Спецификой терапевтического комплекса была коррекция масштаба переживаний, связанных с болезнью, акцент на расширение и углубление экстраморбидной направленности личности, на восстановление утраченных микросоциальных связей, в том числе на повышение значимости половой жизни.

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, В КОТОРЫХ ДЕТИ СТРАДАЮТ ХРОНИЧЕСКИМИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В. А. Скумин. Харьков

Рассматриваются результаты изучения эмоциональных связей между детьми с хроническими болезнями органов пищеварения и их родителями в 45 семьях. Неполными (отсутствовал отец) были 18 семей. Анализ характерологических особенностей матерей показал, что преобладают непреклонный, властный и озабоченный типы поведения, которым соответствуют менторский, авторитарный и опекающий типы воспитания. Свойственные им тенденции родительского поведения не обеспечивают необходимого уровня и качества эмоциональных отношений, способствуют возникновению частых и неоправданных конфликтов, создают непреодолимые барьеры для гармоничного общения. Факторы дистресса, возникающие под влиянием неправильных отношений в семье, влияют на процесс формирования личности детей, на состояние их психики, а также могут иметь непосредственное этиопатогенетическое и клиническое значение при различных неинфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Важное значение в коррекции неадекватных родительских позиций принадлежит повышению уровня психолого-педагогических знаний родителей и своевременному применению семейной и других методов психотерапии.

АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

Г. В. Смирнов, Т. Г. Смирнова. Саратов

Представлены результаты апробации методики адаптационных реакций (неспецифические адаптационные реакции тренировки и активации по Л. Х. Гаркави с соавт.) при восстановлении сексуальной активности у мужчин, перенесших инфаркт миокарда.